AD FLORAE NEAPOLITANAE PRODROMUM APPENDIX QUINTA, EXHIBENS...

Michele Tenore

AD

FLORÆ NEAPOLITANÆ

PRODROMUM

APPENDIX QUINTA,

EXHIBENS CENTURIAS DUAS PLANTARUM NUPERRIME DETECTARUM; NEC NON SPECIERUM NOVARUM VEL MINUS RITE COGNITARUM, CHARACTERES ET ILLUSTRATIONES.

NEAPOLI

APUD R. MAROTTA ET VANSPANDOCH

MDCCCXXVI.

AD FLORÆ NEAPOLITANÆ

PRODROMUM

APPENDIX QUINTA.

MONANDRIA.

1. Salicornia amplexicaulis.
   In inundatis maritimis prope Tarentum; ad *Salina grande*.
2. Callitriche pedunculata.
   In fossis Calabriae ulterioris; ad *Crotonem*.

DIANDRIA.

3. Salvia grandiflora.
   Ad rupium fissuras; prope *Lagonegro*, in Lucania.
4. S. oblongata.
   In arvis, circa Potentiam.
5. S. candidissima *Desfont*. S. argentea *Flor. Neap. Prod. pag. VII.*
   In Calabriae, Lucaniae, Aletiique montibus.
6. Veronica didyma. *Ten. Flor. Nap. Prod. pag. VI. Sprengel System. Veget. t. I. pag. 75.*
   V. agrestis. *Ten. Flor. Nap. t. I. pag. 6. Flora della provincia di Nap. t. I. pag. 10. Petag. Institut. bot. tom. 2 pag. 29*, non *Spreng*. non *Reichemb*.
   Obs. Ab omnibus affinibus facillime dignoscitur capsulae diametro longitudinali duplo transversali breviore, lobis sphaericis, sutura carinali omnino destitutis, polyspermis, stylo exserto. V. agrestis *Linn*. habet folia ovato-oblonga, capsulasque obcordatas acutas, stylo fere nullo. V. opaca *Fries* habet capsulas obreniformes acutas, stylo obsoleto. Fuchsii icon ad V. agrestem *Linn*. pertinet; icones Florae danicae, et anglicae potius ad V. didymam spectare videntur.

Veronica in agris obvia, cum Veronica agresti ab aucturibus commutata, est semper mea V. didyma. V. agrestis vero, nec circa Neapolim, nec alibi unquam inveni; sed tantum ad me misit diligentissimus Ursinius, ex finitimis Aprutii regionibus, ad montem *De' fiori*, collecta.

7. V. Orsiniana: caule erectiusculo undique villoso, lineis villorum duabus crebrioribus, foliis oblongis obtusis, pectinato-semipinnatifidis, calycibus quinquepartitis, laciniis linearibus, pedunculis capillaribus bracteas subaequantibus; planta pubescenti-canescente. *Nob.*

In Aprutii montibus, circa *montem de' fiori*, collegit claris. Orsinius.

A V. austriaca differt calycibus 3-partitis, foliis minus incisis, ac toto habitu.

A V. pedunculari vero calycibus 3-partitis segmentis angustissimis, foliis oblongis, pedicellis brevioribus.

8. Veronica urticaefolia.

In montibus Aprutii: ad *Pizzo di Sivo*.

TRIANDRIA.

9. Crocus vernus. *Var. neapolitanus:* flore purpureo majori serotino; petalis interioribus pallidioribus, pilis in fauce obsoletis; stigmatibus antheras superantibus vel subaequantibus. *Tenor. Memoria sui Crochi (1826) pag. 5 tav. I.*

Crocus neapolitanus *Sims. Bot. mag. 860.*

Crocus vernus latifolius purpureus. *III. Clus. hist. 204.*

In montibus provinciarum meridionalium Hirpiuorum, Lucaniae et Calabriae: ad *Rivezzone*, *Pollino*, *Abellinas*. Floret julio.

10. Crocus Imperati: stigmate incluso 3-fido inodoro staminibus longiore, lobis cuneiformibus incisis crenulatis, corollae laciniis late ellipticis, obtusis subemarginatis, intus concoloribus, violaceo-purpureis, fauce nuda aurantiaca, spatha bivalvi, foliis hyperanthiis linearibus crassis revolutis, costa alba canaliculatis, tunicis radicalibus membranaceis filamentosis. *Ten. Memoria sui Crochi pag. 10 tav. III.*

Crocus vernus latifolius purpureus versicolore flore quinta species *Clus. histor. 205 ic. 2.*

Crocus vernus. *Ten. in litteris.*

Crocus neapolitanus. *Ten. Ad catalog. sem. 1825 adnotationes, pag. 11; non Sims, non Hoppe.*

In montibus humilioribus Stabiarum, insulae Caprearum, Potentiae. Floret martio.

A C. verno differt corollae fauce nuda, spatha bivalvi, bulbi tunicis membranaceis.

A C. versicolore differt spatha 2-valvi, corollae laciniis intus concoloribus, foliis revolutis flaccidis hyperanthiis, bulbis solitariis, flore inodoro.

A C. minimo differt flore duplo majori, corollae laciniis late ellipticis obtusis, foliis lato-linearibus costa alba latiori exaratis.

11. C. Thomasii: stigmatibus odoris erectis inclusis stamina subaequantibus 3-partitis, laciniis sublinearibus truncatis, corollae tubo limbo longiore, laciniis ovato-lanceolatis obtusis concoloribus, fauce hyalina obsolete pubescente, spatha 2-valvi, foliis linearibus erectis hyperanthiis, marginibus ciliato-glandulosis; tunicis radicalibus stupaceo-fibrosis. *Ten. l. c. pag. 12 tav. IV.*

C. sativus. *Ten. Flor. Neap. Prodr. pag. VII. e Flor. Medica tom. I. pag. 21.*

C. sativus. *Thomas in litteris.*

An C. montanus autumnalis Portae. Bauh. pin. 65?

An C. neapolitanus. *Hopp. non Sims?*

A C. serotino et odoro differt corollae tubo foliis breviore, stigmatibus simplicibus, spatha 2-valvi, corollae laciniis angustioribus.

Habitat in nemoribus montium Calabriae citerioris, et Principatus citerioris: ad *Serra di S. Bruno*, ad *Montem della Stella etc.*

12. Gladiolus segetum.

In pratis montosis. In insula Caprearum: ad *Salita di Anacapri.* In Calabria citeriori; ad *Petrosa* prope *Frascineto.*

13. Fedia carinata.

In pratis.

14. F. coronata.

Ibid.

15. Arundo speciosa.

Ad rupium fissuras prope *Lagonegro.*

16. Festuca pungens.

In cacumine montis *Pollini* Calabriae citerioris, loco, vulgo dictum, *Dolce dorme.*

17. Phalaris minor.

In pratis circa lacum, vulgo dictum, *d'Agnano.*

A P. bulbosa differt imprimis radice fibrosa.

18. Dactylis maritima *R. et Schult.* D. littoralis *Host.* non *Will.*

In littoribus Lucaniae et Calabriae; ad *Torre a mare.*

19. Poa distans.

Ibid.

19. *bis.* P. divaricata.

In arvis Calabriae citerioris; ad *Cassanum*, *Crotonem.*

20. Panicum eruciforme *Sibth. et Smith.*

In arvis Aprutii ulterioris; ad *Civita di Penne*, *Teramum.*

21. Aira capillaris.

In arvis communis.

22. Milium coerulescens *Desfont.*

In Calabriae maritimis ; *ad Promontorium Trinitatis*

23. Agrostis pallida.

Ad *Oppidum* Calabriae ulterioris.

24. Festuca rigida *Roth.*

Ad Rhegium Calabriae.

25. Bromus fasciculatus: panicula simplicissima, locustis 7 - floris, flosculorum linearium palea inferiore apice trifida, arista paleam aequante, fol. planis culmoque adscendente glabris. *Presel Gram. sicul. pag. 39.*

B. scoparius *Lam. non Linn. Ten. Flor. Nap. Prodr. supp. I. pag. 59.*

In arvis maritimis insulae Caprearum, Rhegii Calabriae.

26. B. cincinnatus *Ten. Flor. Nap. Prodr. suppl. 3. in Flor. Nap. tom. 2. pag. 378 (an. 1820).*

Ad Jonii litora.

Obs. A B. contorto differt glabritie spicularum, ac flosculorum numero.

27. Avena atherantha: panicula simplici secunda, locustis 2-floris, flosculis calyci aequalibus basi pilosis, paleis bifidis, laciniis setiformibus, aristis gluma duplo longioribus, radice fibrosa annua. *Presel Gramin. siculae pag. 30.*

In arvis frequens.

Obs. Cur A. brevis synonimon fecit claris. Sprengel? An nominis significatione deceptus; quod, spicam intra calycem absconditam sonat? Sunt enim plantae toto coelo diversae.

28. Avena puberula : panicula spiciformi coarctata aequali, spiculis 3 - 4 - floris, flosculis omnibus sessilibus conformibus, valvula calycina majori mutica ; corollae gluma exteriore bifida, laciniis acuminatis, sub apice aristata, arista setiformi recta, vaginis foliisque pubescentibus, culmo erecto, radice fibrosa annua. *Gussone (inedit.)*

In arvis maritimis ; *ad Fusaro*, *ad Montem novum.*

TETRANDRIA.

29. Plantago albicans.

Pl. argentea. *Flor. Neap. Prodr. suppl. I. pag. 59.*

P. velutina Ibid. *pag. 13.*

In Lucaniae et Calabriae collibus maritimis.

30. P. amplexicaulis.

Ibidem : ad *Capo palizzo.*

31. P. serpentina.

In montibus Lucaniae, Calabriae, Aprutii; circa *Silam*, *Coriolanum*, ad *montem de' fiori.*

32. P. capitata. *Ten. Flor. Neap. Prodr. pag. 59 t. 112 f. 1.* non *Presel.*
Obs. P. sericeae *Kitaib.* et *Valdst.* affinis; sed differt foliis integerrimis, scapo basi tantum subangulato, spicis subrotundis.

33. P. Preslii: foliis lanceolatis, longe petiolatis 3-5 nervis, canescenti-hirtis, obiter denticulatis; scapis angulatis, basi decumbentibus; spicis ovatis; bracteis scariosis medio fuscis apice cuspidato-argenteis, calycibus duplo longioribus. *Nob.*
P. capitata. *Presel Florae siculae Prodr. pag. 64.* non *Tenore.*
In pratis montanis insulae Caprearum; ad *Montem Solaro.* Perennis.
Obs. Mirum variat scapis $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ pedalibus, foliis angustissimis fere linearibus et lanceolatis, 3-lin. ad 1 pol. lat. 5 poll. long., spicis subrotundis ovatis, vel ovato-oblongis. P. lanceolatae affinis; sed diversa.
Nomen mutavi, cum antea ad aliam speciem, in Florae Neapolitanae Prodromo descriptam, impositum fuisset.

34. Potamogeton fluitans.
In *Fundorum* lacubus.

35. Galium anglicum.
In pratis siccis; ad *Montem Novum.*
Obs. Nostra planta habet flores atropurpureos, fructusque glabros granulatos. An diversa species?

36. Scabiosa silenaefolia.
Ad Magellae cacumina; ad *Scrimacavallo.*

37. S. ambigua: foliis carnosis, lucidis crenatis, radicalibus obovatis caulinis lyratis vel pinnatifidis, laciniis oblongis remotis integris; corollis radiantibus paucifloris, tubo longissimo; calycibus 5 radiatis, corona spongiosa involuta, aristis divaricatis 3-5 nigerrimis. Planta glabra; flores purpurei vel caerulei. *Nob.*
An S. *glabra carnosa foliis virentibus, flore caeruleo vel purpureo.* Herm. Parad. 221 fig. 221?
In arvis maritimis; ad *Paneta del Fusaro*; floret augusto. Perennis.
A S. columbaria differt seminum corona spongiosa involuta, glabritie et forma foliorum.
A S. uniseta *Savi*, caulo prostrato perenni, glabritie, corollisque duplo majoribus, differt.

38. Exacum filiforme.
In humentibus prope *Casalicchio*, in Principatu citeriori.

39. S. brachiata.
Ad *Pollini* prata editiora, ipse collegi; Gussonius autem in *Rhegii* collibus, prope litora.

PENTANDRIA.

40. Symphytum bulbosum. *Reichenbach Icones cent. 3. tab. 220. Schimper. Flor. bot. Zeit 1825 pag. 17.*
S. tuberosum. *Flor. Neap. Prodr. pag. IV. Flor. Particolare tom. I. pag. 119* (exclusis synonimis).
Obs. Coronae radiis exsertis a reliquis speciebus differt.
41. Cerinthe maculata.
In Lucaniae montibus; ad *pian. di Ruggia* prope *Rotonda.*
42. Campanula spicata.
In cacumine Aprutii montium; ad *montem Corno.*
43. Lonicera balearica.
In dumetis maritimis; ad lacum *Fusaro.*
44. C. nutabunda : caule erecto ramoso stricto, foliis lineari-lanceolatis, repando-denticulatis, pedunculis filiformibus elongatis ante anthesim cernuis demum erectis, corollis infundibuliformibus limbo 5-partito; capsulis subglobosis trilocularibus. *Guss.* (*inedit.*)
Ad Rhegii Calabriae colles.
45. Illecebrum echinatum.
Ibid.
46. Thesium alpinum.
In Aprutii montibus; ad *montem Corno.*
47. Cyclamen neapolitanum Var. B. floribus intense rubris odoris, petalis ovato-oblongis.
Passim cum *C. neapolitano* provenit, et citius florere incipit, nempe sub mensis augusti finem; ad Cumarum portam: vulgo *arco felice.*
Var. C. foliis angustioribus hastato-sagittatis. C. Poli *Delle chiaie* Gior. medico. *An. 1824 n. 1.*
Obs. C. neapolitani folia latitudine ac figura mirum variant, scilicet a cordato-rotunda ad hastato-sagittata, vel cordato-oblonga. Specimina passim occurrunt, quae ab angustioribus ad latiora folia transitum faciunt.
48. Convolvulus lineatus.
Ad insulae Caprearum litora; ad *marina del mulo.*
48. *bis.* C. tenuissimus *Sibth. et Smith. Flor. Graec. Prodr. 1. pag. 134.*
Ad fissuras rupium calcarium Calabriae citerioris circa Moranum et Nerulum (*Castelluccia.*)
Obs. A C. althaeoidi differt foliorum laciniis angustissimis integerrimis, flore albicante dimidio minori.
49. Convolvulus sylvestris. *Kitaib.*
Ad sepes communis.
Obs. Diu cum C. sepium confusus, quo est praecocior, in sepibus circa Neapolim, passim tota aestate florens observatur. Priorisque

minus frequens, *C. sylvestris*, non nisi julio et augusto, in dumetis florentem colligere datum est.

50. C. lucanus : foliis sagittatis postice integris, pedunculis tetragonis, folio longioribus; bracteis ovato-oblongis undique calycem amplexantibus; corollae tubo cylindrico longissimo (2 - 3 poll.) limbo albo, subtus rubro 5 - radiato. *Nob.*

Floret julio. Perennis. Ad sepes Lucaniae, et Principatus citerioris; prope Aulettam et Lauraeam.

Obs. A C. sepium differt corollae tubo duplo longiore cylindrico, bracteis concavis calycem amplexantibus, non planis parallele calyci adpressis. A. C. sylvestri bracteis acuminatis, minime inflato-ventricosis distinguitur.

51. Verbascum micranthum: foliis radicalibus lanceolatis falcatis acutis crenulatis subtus canescentibus, petiolatis, caulinis sparsis sensim angustioribus; racemis compositis. *Moretti Plant. ital. decad. 3. p. 6.*

In Aprutii et Lucaniae montibus.

52. V. phoeniceum.

Ibid. ad *Magellam.*

53. Verbascum floccosum.

In collibus apricis siccis ; circa *Astroni* , *Capodimonte* , *Agnano*.

54. Verbascum macrurum ; foliis decurrentibus ellipticis utrinque albo-tomentosis , crenulatis ; spica densissima , longissima ut plurimum simplici; bracteis ovato-lanceolatis calycem subaequantibus; corollis infundibuliformibus (14 - 15 lin. diamet.) laciniis orbicularibus subtus dense lanatis , filamentis lanatis omnibus , lana flava ; antheris subaequalibus. *Nob.*

Floret julio. Perennis.

In citeriori Calabria , ad montium radices; circa *Dirupata di Murano* , *Campotenese*.

Obs. A V. thaspso differt spica confertissima , floribus omnino sessilibus imbricatis , corollis duplo majoribus , filamentis omnibus aequalibus dense lanatis.

55. Salsola hirsuta Lin.

Chenopodium hirsutum Spreng. DC.

In inundatis salsis ; ad *Fusaro.*

Floret septembri.

56. Periploca graeca.

Ad Hydrunti colles maritimos.

57. Bupleurum aristatum : involucellis ellipticis , aristato-cuspidatis planis trinerviis , nervis pinnatis , caule brachiato. *Reich. Icon. cent. 2 pag. 70 tab. 178.* B. odontiites. *Iacq. collect. 3. Smith. et Sowerby English. bot. 1468.* Odontites luteola *ap. R. et Sch. pag. 380.*

Ad radices montium Lucaniae, et in insula Caprearum.
Floret julio. Annuum.

58. B. glaucum.
Ad adriatici et mediterranei litora; ad *Novam Juliam*, ad *Cosam*.

59. Ligusticum pyrenaicum.
In Aprutii montibus; in *valle d'Orfenta*.

60. Sium siculum.
In insulae Caprearum pratis occidentalibus sterilibus; ad *calata dell' Orco*.

61. Physospermum actaefolium: foliis radicalibus triternatim-pinnatis foliolis subovatis lobatis, inaequaliter et mucronato-dentatis, subtus scabris, supremis ternatis, foliolis 3-fidis grosse serratis. *Presel delic. prag. pag. 128.* Laserpitium aquilegi-folium. *Flor. Nap. Prodr. pag. XIX.*
Habitat in nemoribus Magellae.

62. Ammi crinitum *Guss. ined.*
In arvis argillosis *Syphei*, *Cosae* Calabriae citerioris.

62. *bis.* Anethum piperatum *Ucria.*
Ad agrorum margines; circa portam Cumanam, vulgo dictam *Arco Felice.*

63. Seseli polyphyllum; caulibus declinatis coespitosis ($1\frac{1}{2}$ 2 ped. alt.), parciter breviterque ramosis, petiolis vaginantibus, foliis supradecompositis ambitu ovato, foliolis 3-fidis lineari-teretiusculis, carnosulis, submucronatis (4-5 lin. long. $\frac{1}{4}$ lin. lat.) confluentibus; umbellis compactis 15-20 radiatis, radiis subaequalibus (8-10 lin. long.) fructibus glabris laeviter costatis, immaturis albicantibus, involucellis setaceis, umbellulis brevioribus; floribus albis; herba glauca. *Ten. ad cat. sem. 1825. Adnotat. p. 12.*
Habitat in rupium fissuris, in insula Caprearum, alibique; perennis.
A S. elato differt foliolis brevioribus latioribusque, seminibus omnino glabris. A. S. hyppomarathro differt in primis defectu involucellorum pelviformium. A S. montano seminibus glabris, foliolis crassioribus ac totius herbae glaucescentia. A Seseli glauco foliolis angustioribus numerosis teretiusculis, nec planis linearibus, umbellis compactis breviter multiradiatis differt.

64. Oenanthe approximata *Merat. Nouvelle flore des environs de Paris 2. edition tom. II. pag. 275.*
In paludibus Pestanis; ad *Sele morto.*
Obs. Ab O. pimpinelloidi differt foliis radicalibus ovatis subcrenatis, non cuneiformibus, incisis, involucro universali nullo; statura minori.

65. Cachrys triquetra.
In montosis Lucaniae; ad *Serra del ponte presso Tricarico.*

66. Sibbaldia procumbens.
In Aprutii montibus alpinis; ad *Magellam*, *et montem Cornu.*

HEXANDRIA.

67. Fritillaria messanensis: foliis radicalibus petiolatis, crassis ovalibus enerviis, caulinis sessilibus alternis linearibus, involucro polyphyllo similibus; flore cernuo, petalis viridi-luteis margine purpureis non tessellatis. *Rafinesque. Precis des decouvertes. Palerme 1814 pag. 44.*

F. pyrenaica. *Guss. Catal. plant. Boccadifalco 1821 pag. 26.*

Obs. F. latifoliae affinis, sed involucro flore duplo longiori, cauleque undique folioso distincta.

68. Sternbergia colchiciflora.

An Amaryellis aethnensis. *Rafinesque Çaratt. pag. 84?*

In Aprutii pratis montanis.

69. Colchicum Bivonae: foliis lato-lanceolatis canaliculatis margine planis hysteranthiis; corollae laciniis ellipticis vel obovatis, staminibus pistillis brevioribus, basi incrassato-callosis, ibique luteolis nectatiferisque; antheris oblongis purpureis vel luteis; stigmatibus incurvis puberulo-albidis. *Guss. Catal. adnot. pag. 73.*

C. variegatum. *Biv. Cent. I. p. 27* exclusis synonimis *Lin. et Moris:*

In montibus borealis regni regionis obvium; circa *Campobasso*, *Trivento*, *Monte di mezzo.*

Obs. Colchicum habet lineas sex longitudinales in medio singuli petali insculptas. ~~Melleus liquor a lineis nectariferis~~ proveniens ad insertionem filamentorum colligitur. Cyr. *De Nonnul. Plant. essent. charact. Neap. 1784 pag. 29.*

70. C. neapolitanum: foliis lanceolato-linearibus canaliculatis margine planis; corollae laciniis lanceolato-linearibus, carinatis acutis linea alba intus exaratis (2-3 lin. lat. 12-15 lin. long.), staminibus pistillum subaequantibus, basi incrassato-callosis luteolis nectariferisque, antheris linearibus flavis, stigmatibus incurvis purpureis. *Nob.*

C. autumnale var. neapolitanum. *Ten. ad seminum 1824 catalog. Adnotationes pag. 11.*

In pratis montanis mediae regni regionis, prope Neapolim, ad *Camaldoli*; et ad montem divi Angeli Stabiarum, circa *il piano di Faito.* Floret octobri.

71. C. parvulum; foliis linearibus planis hysteranthiis; corollae laciniis oblongo-ellipticis obtusis rotundatis (2 lin. lat. et 6-8 lin. long.) staminibus pistillis longioribus, basi incrassato-callosis luteolis, lineis nectariferis obsoletis, antheris linearibus flavis, stigmatibus simplicibus. *Nob.*

In montium editiorum pratis: Calabriae, circa *piano del Pollino*; et Aprutii, ad *Magellam.* Floret augusto et septembri.

Obs. A C. montano, cui coeteris simillimum, differt foliis hysteranthiis. A C. pusillo, Sieber (Flora oder Botanische Zeitung 1822 pag. 248) differt floris laciniis obtusis foliisque non coexistentibus.

72. Iuncus sudeticus.
In Silae paludibus.

73. Allium senescens.
In Aprutii montibus.

74. A. suaveolens. *Iacq.*
Ad Magellae rupes.

75. A. ciliatum. *Cyrill.*
Obs. Ab A. subhirsuto *Linnaei* differt petalis carina rubris.

75. *bis.* A. Cupani; scapo tereti, foliis capillaceis cananiculatis; spatha univalvi, petalis lanceolatis acutis; staminibus simplicibus basi dilatatis *Rafinesq. caratteri pag. 86.*
A. montanum, capillaceo folio, floribus purpureis *Bonan. t. 60.*
In Aprutii montibus. Floret septembri.

OCTANDRIA.

76. Polygonum serrulatum; floribus octandris semitrigynis, spicis subracemosis linearibus; foliis lanceolatis acutissimis serrulatis; stipulis vaginantibus setoso-barbatis. *Lagasca Gener. speci. plant.* ad calcem *Elenchi H. R. Matrit 1816 pag. 14.* non *Sprengel.*
Ad Sarni ripas; *circa la Badia di Real Valle.*
Obs. Claris. Sprengelius (Syst. veg. t. 2 pag. 256, anno 1825) P. *serrulatum* illam dixit P. speciem, quam cl. Poiret P. *serratum* antea appellaverat: sano equidem consilio, ne Poiretii planta cum P. *serrato* Linnaei, species nempe abunde diversa, confunderetur. Cum vero jamdiu cl. Lagasca nomen a cl. Sprengelio inditum suae imposuerit plantae; ratione prioritatis, eidem speciei, P. *serrulati* nomen servandum, et P. *serratum* Poiretii alia appellatione vocandum esse unicuique patebit. Quod si P. *Poiretii* tantum dicere voluerimus, eodem tempore, et claris. auctori dignam tribuere laudem, et confusionis caussam auferre, botanicis non dissentientibus, datum erit.

77. Erica multiflora.
In nemoribus *Fundorum.*

78. Chlora acuminata. *Reichemb. Icon. cent. III. pag. 6. f. 207.*
In pratis *raro occurrit.*
Obs. A C. perfoliata differt stylo bifido, calyce minus profunde 8-partito, colore laete virenti.

79. C. serotina. *Reich. l. c. t. 208.*
In arvis maritimis. *Fusaro.*
Obs. A. C. perfoliata differt stylo bifido, foliis superioribus basi

rotundato-ovatis, nec triangularibus, calycis laciniis latioribus, longioribusque.

Floret ab augusto ad octobrem.

DECANDRIA.

80. Gypsophyla Arrostii. *Guss. inedit.*

Arrostia dichotoma: caule dichotomo paniculato, foliis oblongo-lanceolatis glaberrimis subcarnosis; floribus solitariis axillaribus longe pedunculatis. *Rafines. Carat. pag. 76.*

Habitat ad sepes, in Calabriae argillosis; ad *Syphaeum*, *Rhegium*, *Spezzano albanese.*

Obs. Annua; ramis filiformibus superne pubescenti glutinosis, seminibus aeneo-tessellatis.

81. Saponaria officinalis: Var. grandiflora.

Ad sepes circa *Aulettam.*

82. Arenaria austriaca.

Ad *Pollino.*

83. A recurva.

Ad *Montem Cornu.*

84. A graminifolia. *Arduini fascic. 2. tav. 10.*

A Rosani. *Ten. Flor. Nap. Prod. pag. XXVI.*

Obs. Nomen nostrum servandum, cum A. graminifoliae nomine, alia species a nostra diversissima apud botanicos recepta sit.

85. Stellaria alsine.

In Calabriae uliginosis ad *Mongiana.*

86. S. cerastoides Var. *foliis glabris.*

In Aprutii montibus; ad *Magellam.*

87. Cerastium sylvaticum.

In Aprutii sylvis; ad *Montem di mezzò.*

88. Ruta angustifolia *DC.*

In insula Caprearum.

89. Cotyledon horizontalis: radice tuberosa, caule subsimplici, foliis radicalibus peltatis orbiculatis crenatis, pedunculis bractea lineari setacea duplo brevioribus, corollis erectis, demum horizontalibus, laciniis acuminatis *Guss.* (*inedit*).

In locis umbrosis; ad saxa vel muros.

A C. umbilico differt floribus subsessilibus horizontalibus non cernuis.

90. Silene neglecta: petalis emarginatis, calycibus cylindraceis decem striatis, dentibus linearibus calycis longitudinis fere quartam partem attingentibus; floribus remotis secundis subpedunculatis; fructibus erectis vel patentibus; foliis inferioribus spathulatis, superioribus oblongo-lanceolatis. *Nob.*

Var. A. caule erecto minus ramoso, ramis elongatis, floribus majo-

ribus remotissimis, inferioribus longe pedunculatis, fructiferis patentibus, petalis subintegris, fauce squamosa. Planta hirsuta, caule superne pilis glandulosis viscoso.

S. nocturna A. *Flor. Nap. Prodr. pag.* LVI. *Flor. Nap. t. I. pag.* 235. *Flor. part. t. I. pag.* 350 exclusis synonimis.

Var. B. caule erecto simpliciusculo subbifido, ramis apice reflexis, floribus approximatis breviter pedunculatis, pedunculis fructiferis erectis, petalis emarginatis nudis, planta hirsuto-viscidula, pilis glandulosis.

Silene gallica Horti Parisiensis (fide speciminis in eodem horto lecto).

S. nocturna var. B. Cucubalus reflexus *Lin. Flor. Nap. t. 1. pag.* 235. *Flor. particolare di Napoli t. 1. pag.* 350, exclusis synonimis.

Var. C. Caule e basi ramosissimo decumbente, breviter pubescenti, floribus minoribus remotis, petalis minutis emarginatis. Planta glabriscula.

Var. A. Ad nemorum oras (*Astroni*, *Persano*). Var. B. in collibus siccis (*Monte Nuovo Pozzuolo*) var. C. secus vias et ad agrorum marginis circa *Neapolim* et in insula *Caprearum*.

A S. anglica differt foliis spathulatis non lanceolatis, calycibus striatis non profunde sulcatis, floribus secundis non alternis, pedunculis fructiferis minime reflexis.

A S. nocturna differt floribus remotis laxis pedunculatis, nec dense spicatis adpressis, calycinis dentibus longioribus, petalis emarginatis, non 2-partitis.

A S. gallica differt petalis non integris, calycibus non hispidis.

Flores vigilant a vespertino ad matutinum crepusculum. In varietate B. minus constans haec observatur vigilia.

91. S. viscosissima Tenore. *Flor. neap. Prodr. pag.* XXVI.

Hujus loci: Lychnis hirsuta crassifolia *Bocc. Mus. tab.* 118. *f.* 4.

91. *bis* S. sedoides.

Ad Aletii caput.

92. S. behen. In Calabriae Ulterioris littoribus; ad *Capo dell' armi.*

93. S. pelidea *Reichemb.* Ad Magellae montes.

DODECANDRIA.

94. Euphorbia serrata.

In montium Mamurrarum nemoribus (*Gole d'Itri*).

Obs. Nostra planta est perennis.

95. E. cuneifolia: umbella 5-fida 3-fida 2-fida vel dichotoma, involucris, foliisque cuneato-spatulatis glabris, antice acute serrulatis; capsulis 3-gonis, setis crassis obsitis, seminibus punctato-scabris. *Guss.* (*inedit.*). In pratis nemorosis, (*Persano*).

Obs. Ab. affinibus E. Peplo et E. rotundifolia differt fructibus muricatis, verrucis corniculatis.

96. Reseda gracilis; caulibus diffusis ramosissimis, foliis omnibus 3-fidis, laciniis linearibus tenuissimis, intermedia raro bifida vel 3-fida, corollis luteis, fructibus elongato-ovatis, argute tricuspidatis. *Nob*.

In maceriis et sepibus Calabriae et Lucaniae (*Rotonda*, *Çastelluccia*). Perennis.

Obs. Affinis R. lutae, a qua differt caule ramosissimo in amplum coespitem excrescente, foliorum laciniis lineari-setaceis, fructibus clavatis.

A R. ramosissima *Will. Enum*. 1. *pag*. 495 differt, caule diffuso, fructibus elongatis.

A. R. saxatili *Will. l. cit.*, differt caule minime simplici stricto.

97. Opuntia amiclaea: articulato-prolifera, articulis orbiculatis vel ellipticis latissimis (10 poll. lat. 15. long.) planis compressis non turgidis vel repandis, spinis validis divergentibus inaequalibus (3-8) teretibus candidis (6. 18 lin. long.) lanugine et spinis circinalibus nullis; floribus luteis, fructibus confertissimis carnosis turgidis ovatis, luteo-rubris, superficie tuberculis approximatis lanuginoso-spinulosis tessellatim reticulata. *Nob*.

In rupibus calcareis haud procul ab Amicla veterum (*Monticelli*, *Portella*) elapso vere, in peregrinatione ad Circaeum et finitimas Regni regiones suscepta, amicissimis Professore *Mauri* et doctore *Felice Zecca* comitibus, collegi.

Obs. Variat articulis subinermibus, spinis brevioribus vel longioribus.

Ab O. Tuna, vulgari et polyantha differt lanugine spinisque circinatis nullis; ab O. Polyacantha (*Cactus Dillenii Kerr.*) articulis minime turgidis, sed aequaliter compressis, spinis rectis non divaricatis.

Ab O. maxima (*C. elatior*) articulis non oblongis spinis candidis non fuscis. Caeterum haec species tantum ab affinibus differt, quantum inter seipsas relatae a neotericis receptae species differunt. Ita ut si cum veteribus sub C. Opuntiae Linn. varietates eas omnes complecti voluerimus, nostram plantam quoque eodem trahere opus erit.

ICOSANDRIA.

98. Rubus corylifolius.

In Lucaniae sepibus.

99. Aizoon hispanicum.

Ad Calabriae Ulterioris rupes maritimas (*Capo Spartivento*).

100. Mesembryanthemum crystallinum. Ad Jonii scopula, prope Tarentum.

101. Spiraea denudata : caule herbaceo foliis interrupte pinnatis concoloribus glabris, subtus ad venas pubescentibus, pinnis cordato-ovatis, impari majori 3-lobo, floribus corymbosis polygynis; petalis albis *Presel. Flor. Cechica pag. 101.*
In pratis humidis montium Samnii, et Aprutii; circa *Pesco Costanzo*, *Revisondoli*, et in monte Matesio. Perennis.

102. Rosa alpina.
In Aprutii montibus. *Monte di Capo d' acqua.*

103. Rubus saxatilis.
In Magellae nemoribus.

104. Potentilla crocea *Haller fil. Schleich.*
Ad Montem Cornu.
Obs. Specimina authentica P. croceae possideo, a clss. Reynerio. Thomasio et Schleicherio comunicata, in quibus petala obcordata evidenter observantur, minime vero obovata ut in P. aurea, inter cujus synonima cl. De Cand. P. croceam enumerare arbitratus est.

POLYANDRIA.

105. Capparis rupestris. Ad muros et scopula: circa Neapolim.

106. Helianthemum sessiliflorum. In collibus Tarentinis.

107. H. arabicum.
In collibus Rhegii Julii.

108. Trollius europaeus.
Ad montem Cornu Aprutii Ulterioris.

109. Papaver apulum: capsula hispida obovato-elliptica, petalis sepalis pilosis triplo majoribus; caulibus pluribus adscendentibus ramosis hispidis; foliis bipinnatisectis, lobulis abbreviatis, ovato-oblongis obtusiusculis. Planta hispida *Nob.*
In Apuliae arvis. Annuum.
Obs. P. hybrido affinis, a quo differt florum fere P. rhoeadis magnitudine, foliorum laciniis brevissimis obtusis, caulibus adscendentibus.

110. Delphinium nanum.
In arvis sterilibus. Annuum.

111. Ranunculus neapolitanus; foliis radicalibus ultra medium 3-fidis, lobis rhombeis, parciter lobato-dentatis, dentibus obtusis, caulinisque petiolatis, lobis angustioribus subinciso-dentatis, omnibus leviter pubescentibus, nigro alboque variis; caule erecto, petiolisque patentissime pilosis; pedunculis teretibus; carpellis stylo uncinatis laevibus; radice fibrosa *Ten. Ad sem. 1825 Catal. adnot. pag. 11.*

In pratis uliginosis communis.

Obs. Affinis R. *lanuginoso* et R. *nemoroso* ; a priori differt foliis minime holosericeis, segmentis primariis subrotundo-rhombeis, dentibus obtusis, ut potius crenata dici possint, nec cuneiformibus, pilis patentibus. Ab altero differt foliis minus incisis, dentibusque obtusis, pedunculis teretibus.

112. R. velutinus ; foliis ultra medium 3-fidis, lobis latis cuneiformibus inciso-dentatis, cauleque erecto, holosericeis, pilis adpressis in foliis, in petiolis vero et in caule patentibus, pedunculis teretibus laevibus; carpellis muticis; radice fibrosa. *Ten. loc. cit. pag.* 12.

In locis aquosis habitat : in loco, vulgo, *Pascone*. Perennis.

Obs. Affinis R. lanuginoso, R. nemoroso et R. neapolitano ; ab omnibus differt, inprimis, carpellis omnino muticis.

DIDYNAMIA.

113. Satureja consentina : caulibus suffruticosis decumbentibus, ramis filiformibus ; foliis lineari-setaceis utrinque attenuatis petiolatis, revolutis hispidis (5. lin. long. $\frac{1}{4}$ lin. lat.) pedunculis cymosis secundis patentibus ; calycis dentibus capillaribus fere longitudine tubi incurvi, bracteis setaceis, calyce brevioribus. Planta hispido-scabra canescens ; corollae purpureae pilosae. *Nob.*

In Calabriae sepibus; ad *Porta Piana et Donnici, prope Consentiam.* Floret Julio.

114. S. juliana (*vera*).

In insula Caprearum, ad agrorum margines.

Obs. Ab affinibus S. tenuifolia et S. graeca differt verticillis compactis rite fastigiatis bracteis longioribus, e floribus subsessilibus dense parallele stipatis compositis. Planta glaucescens. *Icon Morisonii; hist. 3. sect. XI. t. 17. fig. 4.* adamussim plantae nostrae respondet.

S. tenuifolia habet verticillos spicatos laxiusculos, bracteis duplo breviores. Planta atro-virens est.

S. graeca habet peduncolos axillares longe racemosos.

114 *bis* S. nervosa.

Ad Jonii rupes maritimas, circa Tarentum et Gallipolim.

115. Phlomis parvifolia : foliis petiolatis ovato-subrotundis crenatis tomentosis subtus incanis, supremis ovato-oblongis, bracteis ovatis acutis calyce albo-tomentoso dimidio brevioribus, dentibus calycinis ovatis mucronatis erectis, galea repando-crenata, caule adscendente fruticoso. *Presel deliciae pragens. pag. 86.*

P. microphylla *Sieber Reise nach der Insel Kreta Leipzig 1823 1. pag. 190. t. VIII. Botanische zeitung, octob. 1823 p. 598.*

P. cretica fruticosa, folio subrotundo flore luteo *Tournef. Corol. p. 10.*
Verbasculum salvifolium *P. Alp. Exot. 103 icon.*
In Calabriae collibus saxosis.

116. Mentha origanoides; floribus capitato-spicatis, capitulis confertis, bracteis ovatis integerrimis dense suffultis, staminibus corolla longioribus, foliis subcordato-ovatis planis, petiolatis serratis obtusis, caule erecto hirto. Planta pubescens. *Ten. Ad sem. 1825 catal. adnot. pag. 11.*

Habitat in fossis aqua repletis. Perennis.

Cl. Rosanus invenit prope Potentiam.

117. M. urticaefolia: floribus verticillato-spicatis, verticillis infimis e capitulis breviter pedunculatis conflatis, foliis late ovato-ellipticis conduplicatis (2. 3. poll. long. 18 lin. lat.) petiolisque hirsutis, grosse serratis biserratisve, dentibus divergentibus, floribus exiguis, staminibus corolla brevioribus, bracteis cuspidatis, inciso-dentatis, caule hirto erecto 4-pedali, Planta lacte virens, aestivatione erubescens. *Ten. loc. cit.*

Habitat cum praecedenti, et in Calabriae paludibus.

118. Mentha austriaca.

In Aprutii et Samnii montibus (*Piani di Pesco Costanzo, di Revisondoli*).

119. Mentha Rosani: spicis longissimis gracilissimis e verticillis remotiusculis exiguis, foliis ellipticis vel elliptico-oblongis, planis grosse dentatis, supra viridibus subtus incanis, dentibus divergentibus cuspidatis; caule calycibusque hirtis; staminibus corolla longioribus, bracteis linearibus, verticillis nubilibus longioribus, demum subaequantibus. *Nob.*

In Potentiae humentibus: *cl. Rosanus.*

M. *crispae* var. A, et M. *sylvestri* affinis, a priori foliis ellipticis planis subtus incanis non cordatis, ab altera foliis grosse remoteque dentatis; ab utraque spicis longissimis differt.

Obs. Sub eodem *Menthae crispae* nomine, duo latitant species satis distinctae, quarum differentias, primus recte adumbravit claris. Lamarckius, in *Encyclopediae dictionario botanico tom. 4. pag. 106.*

Menthae crispae verae Linnaei diagnosis haec est:

M. spicis subcapitatis, calycibus pedunculisque glabris, foliis cordato-orbiculatis glabris undulato-crispis, dentatis dentibus cuspidatis, bracteis inferioribus laciniatis.

Ad eam sequentia synonima pertinent.

M. crispa *Lin. Will. sp. 3. pag. 77. Pers. Syn. 2. pag. 119. Spreng. Syst. 2 pag. 723.*

M. crispa danica aut germanica speciosa Parkinsonii *Raj. tom. 1. pag 531. Moris. hist. 3. pag. 367. Sect. 11. tab. 6. fig. 5.*

M. crispa *Riv. mon. tab. 50.*
M. crispa. Var. B. Lamarck. *Dict. Encycl. tom. 4 pag. 106.*
In Germaniae, Daniae et Angliae paludibus habitat.
Obs. In Horto Plantarum Austriae indigenarum, cl. Hostii curis commisso, Vindobonae, anno 1824, primum cum congeneribus hanc menthae speciem cultam vidi, atque herbario servavi.

Alteram speciem quam M. Lamarckii nomine, haud immerito appellare possumus, sequenti diagnosi distinguendam censeo.

M. Lamarckii: spicis oblongis, verticillis approximatis, foliis cordatis serratis undulatis subsessilibus, dentibus divergentibus cuspidatis, supra viridi-pubescentibus subtus incanis, calycibus pedunculisque hirtis, staminibus corollam aequantibus, bracteis linearibus integerrimis.

Ejusdem synonima habeantur.
M. crispa var. *A. Lamarck l. cit.*
M. Rotundifolia var. B. *De Can. Flor. Franc. t. 3 p. 354.*
M. spicata rotundifolia crispa. *Joan. Bauh. hist. 3. p. 2. pag. 218.*
M. altera *Dod. Pemt. 95.*
M. spicata rot. crispa cruciata *Parkins. Raj. l. cit.*
M. rotund. crispa spicata *Gas. Bauh.* M. sativa altera *Dod. Moris. l. cit. tab. 6. fig. 4.*
M. crispa *Horti Par.* (fide speciminis, quod in eodem horto, ipse, anno 1824, legi).
Mentha crispa Florae neapolit. *tom. II. pag. 29*, nec ad M. crispam Linnaei, nec ad M. Lamarckii, sed potius ad veram M. rotundifoliam spectare videtur; ad eam nempe, specimen hoc nomine inscriptum, in eodem Horto Vindobonensi lectum adprime respondet.

120. Galeopsis grandiflora var. flore purpureo.
In Aprutii arvis nemorosis.

121. Nepeta violacea.
Ad Montem Cornu.

122. Betonica stricta.
Ibidem.

TETRADYNAMIA.

123. Biscutella incana: caule basi suffruticoso, siliculis glabris subundulatis, in disco punctis elevatis leviter exasperatis; foliis incanis, strigoso-hispidis oblongis aequaliter sinuato-dentatis, dentibus obtusis. *Nob.*
Ad saxorum rimas; ad *Dirupata di Murano*, in Calabria Citeriori. Perennis.
Obs. B. saxatili affinis, a qua differt caule basi caespitoso suffru-

ticoso; foliis incanis strigosis, siliculis undulatis duplo majoribus.

124. B. ciliata *DC.*
B. coronopifolia *Will. non DC.*
B. didyma. *Flor. Nap. Prod. pag. 38.*
Thlaspi clypeatum *Clus. hist. 2. pag. 133.*
In tectis communis.

125. Berteroa obliqua *DC.*
In Apuliae collibus.

126. Myagrum orientale.
In Calabriae montosis humentibus (*Pollino*).

127. Arabis rosea *D. C. Syst. 2. p. 215. Prodr. I. p. 142.*
In montibus Stabiarum, circa Vesevum etc.

MONADELPHIA.

128. Erodium chium.
In arvis maritimis Miseni.

129. Malva nicaensis.
In Insulae Caprearum et Puteolorum arvis.

130. Pavonia veneta *Spreng. System. tom. 3.*
Hibiscus pentacarpos *Lin.*
In paludibus acheruntinis (*Fusaro*).

131. Malope malacoidos. Var. sinuata.
In Calabriae arvis.

DIADELPHIA.

132. Polygala buxifolia *Reich. Icon Cent.*
P. vulgaris var. *B. Ten. Flor. part. 1. p. 518.*
P. thuringiaca. *Spreng. 3. p. 166.*
In pratis montosis Stabiarum (*Piano di Faito*).

133. P. comosa Reich. *l. cit.*
Ad colles maritimos Calabriae (*Lo Bianco*).
Obs. A P. vulgari differt bracteis flores virgineos non aequantibus, foliisque acutioribus.

134. Lathyrus grandiflorus *Sims; et Sibth. et Smith. Fl. Gr. Prod. 2. p. 67.*
L. brutius Tenore. *Ad seminum 1825 enum. adnotationes. p. 12.*
Obs. Sub eodem L. *grandiflori* nomine aliam L. speciem nuperrime descripsit. cl. Longsdorf (*Sylloge plant. novar. Ratisbonae 1824 p. 182*) a nostra planta abunde diversam.

135. L. sessilifolius: radice tuberoso-fibrosa, caule adscendenti simplici, foliis unijugis petiolo communi destitutis, foliolis lanceolato-li-

nearibus argute mucronatis, pedunculis subtrifloris folio longioribus, calycibus corollae tubum subaequantibus, laciniis lanceolatis subaequalibus, leguminibus planis polyspermis; planta glabra, corollae ceruleae alis carina longioribus, stylo plano antice dilatato villosulo *Nob.*

L. attenuatus *Flor. Nap. Prodr. pag. 41 non Viviani*:

Ad Lucaniae sepes. Perennis.

A L. tuberoso differt foliis sessilibus, foliolis lanceolato-linearibus.

Ab Orobo sessilifolio, generis characteribus, foliisque unijugis distinguitur.

136. L. ciliatus; pedunculis 1 floris ultra medium articulatis, petiolo brevioribus, foliolis 2 - (raro) 3 - jugis, foliolis inferioribus cuneiformi-obovatis retusis mucronatis ciliatis, superioribus linearibus elongatis, acutis glabris, petiolis setula terminatis, corollis calyce duplo longioribus, leguminibus compressis linearibus cernuis 4-5 spermis. *Guss. inedit.*

In Calabriae maritimis: ad *Capo dell'Armi.*

137. L. longifolius; pedunculis multifloris, cyrrhis diphyllis, foliolis linearibus (4-5 poll. long. 2 lin. lat.) trinerviis, stipulis semisagittatis cuspidatis, internodiis membranaceis, leguminibus glabris, linearibus (3 poll. long. 3 lin. lat.) floribus purpureis. *Ten. ad sem. 1825 catal. adnot. pag. 12.*

Habitat ~~in montibus Lucaniae.~~

138. L. dubius: caule adscendente ramoso, foliolis conjugatis, inferioribus lanceolatis, superioribus linearibus mucronatis, trinerviis, petiolis stipulas semisagittatas, medio dente setaceo instructas, subaequantibus; floribus purpureis, pedunculis muticis leguminibus oblongis compressis 2-3 spermis, seminibus sphaericis. *Ten. ad sem. 1825 cat. adn. pag. 11.*

Habitat in pratis sterilibus.

Floret aprili et majo.

Obs. A L. cicera differt caule rigido erecto, leguminibus oblongis, medio coarctatis, dorso plano.

139. Orobus albus var. asphodeloides DC.

In Lucaniae pratis argillosis.

140. O. Jordani; radice tuberoso-fasciculata asphodeliformi; foliis 3-4 jugis, foliolis oblongo-lanceolatis cuspidatis stipulis, semisagittatis, subulatis, pedunculis 4-6 floris, folio duplo longioribus; stylo geniculato, leguminibus glabris planis. Planta glabra exsiccatione nigrescens; flores coerulei. *Nob.*

Habitat in pratis humentibus Lucaniae et Principatus citerioris.

Ab O. tuberoso differt radice asphodeliformi, non tuberoso-fibrosa, pedunculis multifloris, foliis 3-4 jugis dimidio minoribus. *Icon Flor. dan. t. 781.* O. *tuberosum* optime repraesentans, nostrae

plantae nullo modo referri potest. Ab O. nigro differt caule prostrato; foliis 3-4 jugis, non sexjugis, duplo minoribus.

Obs. A cl. Rosano primum comunicatus, radicis defectu in herbario cum C. *tuberoso* confusus mansit; cum vero solertissimus Ferdinandus Jordanus, proxime superiori aestate, radicibus onustam eandem plantam ad me attulisset, de vera ejusdem diagnosi certum me fecit; idcirco ab O. *tuberoso* eam sejungere, ipsique botanices cultori eximio inscribere operae pretium duxi.

141. Ononis Dehnhardtii; floribus subsessilibus spicatis, foliis ternatis; foliolis obovato-cuneatis, arguto biserrulatis, floribus subsessilibus, cauleque erecto, pubescenti-viscoso, corollis calyce majoribus, vexillo roseo, alis et carina alba, leguminibus ovatis glabriusculis, 2-3 spermis. *Ten. ad sem. 1825 catal. adnot. pag 11.*

Habitat in sabulis litoris, circa *Fusaro.* Floret majo. Annua.

142. Vicia triflora. *Ten. Flor. Nap. Prodr. XLII.*

In Lucaniae et Calabriae sepibus (*Castrogiovanni*).

Obs. A V. calcarata, cui affinis, differt foliolis 18-20, cuneato-linearibus retusis vel emarginatis cum acumine, non lanceolatis obtusis, stipulis digitatis, pedunculis folia subaequantibus.

143. V. Gerardi.

In insulae caprearum et montis divi Angeli Stabiarum sepibus.

144. V. sativa var. A.

V. obovata DC.

V. nemoralis Persoon. Ibid.

144. *bis.* V. biennis. In sepibus et nemoribus maritimis (*Fusaro Licola*). Floret julio.

145. V. polysperma; caule 6-8 pedali ramosissimo, foliis cirrhosis foliolis 14-16 ovato-oblongis obtusis integerrimis mucronatis glabris, cirrhis decompositis, stipulis dentatis; pedunculis 8-10 floris folio longioribus; floribus erectis laxe racemosis, dentibus calycinis inaequalibus superioribus brevioribus, inferioribus setaceis longioribus, leguminibus lineari-lanceolatis 3-pollicaribus; planis glabris 14-20 spermis. *Nob.*

Flores magnitudine viciae sativae pallido-coerulei.

In sepibus nemoris vulgo *degli Astroni.* Floret junio. Annua?

V. altissimae affinis; sed in hac legumen pollicis longitudinem non excedit; foliola apice truncata elliptica (5 lin. long. 3 lat. in nostra 8 lin. long. 5 lat.), flores nutantes dense racemosi observantur, unde major cum V. bienni affinitas.

146. Ervum Terronii; foliis cirrhosis, foliolis 8-jugis lineari-ellipticis truncatis, submucronatis glabris, pedunculis multifloris (4-8) aristatis folio multo brevioribus; laciniis calycinis lanceolato-linearibus aequalibus pubescentibus corollam aequantibus; leguminibus glabris subovato-truncatis, inflato-reticulatis, seminibus lentiformibus badiis. *Nob.*

In sepibus Principatus citerioris, prope *Sanseverino* invenit Joannes Terrone, scientiarum naturalium studiosus alacerrimus. Floret junio. Annuus.

Ab E. dispermo differt glabritie, pedunculis multifloris, et patria.

147\. Astragalus sirinicus: frutescens petiolis spinescentibus, foliis 14 jugis, foliolis elliptico-oblongis obtusiusculis utrinque adpresso-pilosis; pedunculo folio subbreviore, floribus racemoso-spicatis 2-10; calycibus nigro alboque pilosis, dentibus setaceis, corollis flavis, calycibus triplo longioribus, bracteis lineari-setaceis, pedicellis triplo longioribus, leguminibus villosis. *Nob.*

In montis *Sirini*, prope *Lagonegro*, pratis saxosis. Floret julio.

Ab A. retuso differt floribus racemoso-spicatis non subcapitatis, calycibus ovatis, bracteis linearibus.

Ab A. pungenti differt foliis virescentibus glabriusculis obtusis, non incanis sericeis acutis, foliolis 10 - 12 jugis, calycibus campanulatis non subulatis, floribus flavis non albis.

Ab A. massiliensi differt dentibus calycinis lineari-subulatis nec oblique truncatis, dentibus brevibus, bracteis pedicellis longioribus, floribus racemosis, calycibus hirtis.

Ab. A. angustifolio, foliis non glabris, calycibus non cylindricis, foliis non sexjugis.

148\. Genista depressa: caulibus diffuso-prostratis, ramis angulatis striatis villosis, ovali-oblongis acutis utrinque pilosis, floribus axillaribus solitariis breviter pedunculatis, calycibus subcylindricis pilosis dentibus setaceis, corollis glabris, vexillo luteo-croceo carinam aequante. Suffrutex. *Nob.*

In pratis montanis Lucaniae; ad *piano di Ruggia*. (*Rubbia* vel *Cupia*) Floret julio.

A G. prostrata differt foliis utrinque pilosis, calycibus hirtis dentibus setaceis.

149\. Spartium infestum.

In Calabriae sepibus, circa *Donnici*.

150\. Psorolea bituminosa Var. angustifolia.

Secus vias Lucaniae, et alibi.

151\. Anthyllis hermanniae.

In Calabriae maritimis; ad *Caporizzuto*, circa *S. Leonardo di Cutro*.

152\. Biserrula Pelecinus. Var. *flore albo*.

In Rhegii julii litoribus.

153\. Adenocarpus intermedius D. C.

Spartium complicatum. *Lin.*

In Scyllae sabulosis. Ad *Piano di Scrisi*.

154\. Lotus pusillus *Viviani*.

In Rhegii julii collibus.

Obs. Pedunculi quandoque biflori, legumina compressa linearia, marginibus incrassatis, 20 - sperma.

155. L. diffusus.
In collibus aridis; ad *Montem novum*, et circa *Stabias*.
156. L. pilosissimus. Var. *filiformis*; ad *Montem novum*.
Obs. L. hispido affinis, sed differt leguminibus subteretibus.
157. Trifolium badium.
In montibus Aprutii; ad *Pizzo della cavata*.
158. T. intermedium: caule diffuso, foliolis lanceolatis, stipulis basi connatis, caudis brevibus linearibus spica conico-oblonga, corollis calyce sublongioribus. *Guss. Catal. pag. 82 Savi Bot. Etrus. t. 4. pag. 20*, non *Lapeyrouse*.
In arvis salernitanis, apulis et alibi.
159. T. tenuifolium. *Ten. Flor. Neap. Prodr. XLIV.*
T. stramineum *Guss.* in litteris.
In Lucaniae et Hydrunti collibus: *Genosa*, *Ugento*.
160. T. praetutianum: caule suffruticoso, ramis simplicibus adscendentibus, foliolis lanceolatis denticulatis, capitulis globosis, stipulis duabus bracteantibus, dentibus calycinis corolla brevioribus. *Guss. ined. Savi Bot. Etrus. t. 4. pag. 16.*
In Aprutii montibus: *Costone*, *monte Corno*, *Majella*, *Morrone*.
161. T. pallidum Savi.
In pratis nemorosis: *Persano*.
162. T. strictum.
In pratis montanis: ad *montem Stella*, *Princip. citer.*
163. T. supinum.
In pratis nemorosis: circa *Persano*, *Potentiam*.
164. T. brutium: caule adscendente ramoso, foliis petiolatis, foliolis obcordato-cuneatis, denticulatis, terminali vix petiolato, capitulis axillaribus sphaericis, pedunculis folio longioribus, laciniis calycinis inaequalibus, 2-sperioribus brevissimis, reliquis apice piliferis, vexillis amplis aureis sulcatis, carina crocea, seminibus ellipticis flavis, radicula prominula. Planta 2-3-pollicaris, pubescens. *Nob.* Floret julio. Annua.
In pratis siccis montis *Cucuzzo* Calabriae citerioris.
A T. procumbenti DC. et Smith. differt caule fere erecto, capitulis post anthesin quoque sphaericis, floribus duplo majoribus, colore floris statura minori, ac toto habitu.
A T. agrario DC. differt foliis petiolatis, foliolis obcordatis, nec oblongo-ovatis, intermedio petiolato, calycibus piliferis, capitulis sphaericis aureis, non ovoideis flavis; seminibus ellipticis flavis nec badiis irregulariter cordatis.
165. Melilotus longifolia *Ten. Flor. Neap. Prodr. p. XLIII.*
Obs. A M. sulcata differt, leguminibus monospermis, caule erecto parum ramoso, foliis angustioribus.
A M. neapolitana differt spicis densis, foliis non obcordatis.

M. neapolitana habet racemos paucifloros laxatos, legumina lacunoso-rugosa monosperma, folia inferiora deltoidea obovata.

166. Medicago sphaerocarpa.

In agris salernitanis; *Persano*, *Pesto*, *Sessa*.

POLYADELPHIA.

167. Hypericum australe. Trigynum. Petalis calycibusque integris nigro-punctatis, foliis opacis impunctatis venosis oblongo-ellipticis obtusis, margine nigro-punctatis, caule herbaceo basi obsolete quadrangulo, floribus cymosis, petalis calyce triplo majoribus; filamentis antherisque impunctatis. *Nob.*

H. humifusum *Flor. Neap. Prodr.*

H. dubium. *Mauri Rom. plant. cent. XIII. pag. 27, exclusis synonimis.*

In collibus siccis Lucaniae, et Princip. citerior. circa *Potentiam*, *Persano*, *Sessa*, *Lauriano*. Floret majo. Perennis.

Obs. Ab H. dubio differt foliis omnino impunctatis, obtusissimis, foliis minoribus e majorum axillis nullis, corollis triplo majoribus, planta caeterisque partibus triplo minori, caulibus simplicissimis. In montis Circaei sepibus, clariss. Mauri, in romano archigymnasio botanices professore, comite, elapso vere quoque collegi.

168. H. hyssopifolium.

In Aprutii montibus; ad *montem Capraro*.

SYNGENESIA.

169. Hieracium praenanthoides.

In Samnii et Aprutii montibus; ad *Montem di Mezzo* et *Magellam*.

170. H. pumilum: radice praemorsa, scapis unifloris, decumbentibus, flaccidis hispidiusculis, ramentis foliaceis, rariter ramulo florifero instructis, calycibus calyculatis, pedunculisque subflore farinoso-glabriusculis, foliis lineari-lanceolatis glabris, utrinque attenuatis dentatis, vel runcinato-pinnatifidis, dentibus vel laciniis remotis lanceolato-linearibus acutis parallelis. Habitus Apargiae, sed pappus piloso-scaber. *Nob.*

In Aprutii, Lucaniae, et Calabriae, editiorium montium pratis. Floret julio et augusto. Perennis.

Obs. H. aureo affinis, a quo differt habitu graciliori, partibus omnibus duplo minoribus, pedunculis calycibusque subfarinoso-albicantibus, nec pilis nigricantibus undique obsitis; foliis (2-4 poll. long. 2-5 lin. lat.), lobo extimo hastato triangulari acuto, nec subrotundo vel subovato-obtuso; laciniis remotissimis angustissimis vel nullis. Major est affinitas cum H. Columnae *Ten.* (Apargia lucida *Flor. Neap.*);

4

sed in hac partes omnes glaberrimae, crassiores, laete virentes, rigidioresque sunt; calyces pube farinosa omnino destitutae, squamae laxae, foliorum laciniae adproximatae triangulares incurvae, habitusque omnino diversus et potius ad *Leontodontem* pertinens observatur.

171. Hieracium Columnae. *Nob.*

Hieracium minus IV. H. pumilum IV. *Colum. Ecphr.* 2. *pag.* 29 *tab.* 31.

Apargia lucida *Ten. Ad Catal. H.R. neap. app. altera p.* 71. *Flor. Neap. Prodr. sup.* 3. *pag.* 380 *et Flor. Nap. t.* 2. *pag.* 164 *tav.* 70.

Obs. Ob pappum non plumosum sed scabrum tantum ad *Hieracii* genus meam plantam amandare putavi. Quoniam vero clar. *Columnae* planta, ab auctoribus ad H. aureum referta, Hieracio nostro rectius respondet, ad eandem et iconem ipsam et synonimum trahere arbitratus sum.

172. Apargia Rosani: scapo unifloro nudo, glabriusculo, prope florem hispido, foliis runcinato-pinnatifidis hispidis, lobis remotissimis, extimo triangulari-hastato, pilis simplicibus, calycibus hispidis, radice fibrosa. *Nob. Adsem.* 1825 *enum. adnot. pag.* 11.

Habitat in collibus prope Potentiam; perennis.

Invenit diligentissimus Rosanus.

173. Tolpis grandiflora: caule corymbifero, foliis radicalibus lanceolatis dentatis, involucris setaceis, calyce farinoso longioribus, flor. pollicaris diametri, seminibus 5-8 aristatis. Planta glabra glaucescens. *Nob.*

Ad nemorum margines, circa *Lagonegro.* Floret julio. Annua?

Obs. A T. umbellata differt, floribus duplo majoribus, foliis minus cisis, caule basi simplici, statura 4-pedali, seminibus multiaristatis.

174. A Villarsii. Var. foliis glabriusculis.

In Aprutii montibus; ad *Montem de' fiori.*

174. *bis.* A hastilis Var. scapo elongato, calyce hirto.

Ibidem et in Magella.

175. Carduus chrysacanthus; caule simplici, foliis decurrentibus (4-6 poll. long. 1 poll. lat.) pinnatifidis, laciniis palmato-spinosis utrinque villosis, subtus canescentibus, margine denticulato-spinosis, spinis luteo-aureis, primariis longitudine laciniarum, floribus solitariis purpureis, axillaribus et terminalibus, breviter pedunculatis, anthodiis hemisphaericis, diametri 12-15 lin. squamis foliaceis, apice spinosis, inferioribus reflexis. *Ten. ad sem.* 1825 *catal. adnot. pag.* 12.

Card. carlinoides. *Flor. Neap. Prodr. pag.* 48.

Var. calycibus lanuginosis, squamis angustioribus laxis, foliis latioribus viridibus.

Card. carlinaefolius. *Flor. Neap. Prod. pag. 48.*
Habitat in montibus Aprutii. Floret julio. Perennis.

176. Cnicus pratensis *Huds.*
In Aprutii montibus; ad *Montem di Accumuli.*

177. C. acaulis.
In Aprutii et Samnii montibus; ad *montem di Mezzo*, et *Magellam.*

178. C. samniticus: caule lanuginoso striato bipedali ramosissimo, ramis paniculatis, foliis semidecurrentibus, sinuato-pinnatifidis, spinosis, lobis alternis minoribus divaricatis, supra strigosis, subtus incanis, floribus purpureis subaggregatis sessilibus, anthodiis ovatis glabris (4 lin. lat. 6 lin. long.); spinis simplicibus. *Ten. ad sem. 1825 enum. adnot. pag. 12* an *Carduus lanceolatus*. Bauh. hist. 3. p. 58 ic.?
Habitat in montibus Samnii.

179. Anthemis montana. Var. grandiflora.
In rupibus calcareis montis Virginis, prope Abellinas.
Ab A. montana, omnibus partibus duplo major, floribus pollicari diametro et ultra, constanter diversa.
Obs. A. alpina vera in Italiae meridionalis alpibus desideratur. Plantam quam hoc nomine botanici mihi benevole comunicavere, semper ad A. montanam pertinere cognovi. Specimen ejusdem, Pyreneis lectum, a claris. Moricandio quoque accepi, eodem A. alpinae nomine inscriptum. A. alpina vera, a cl. Willdenowio optime adumbrata, habet folia atrovirentia pinnatifida, laciniis subaequalibus lineari-subulatis, pectinis instar dispositis; ejusdem specimina, in alpibus pedemontanis, circa *Montanvert*, anno 1824, julio florentia legi.

180. A. chia.
In sabulosis Calabriae, a *Rhegio* ad *Miletum.*

181. Santolina alpina.
In Aprutii montibus circa *Morrone.*

182. Anacyclus clavatus.
In collibus Cotronianis.

183. Filago eriocephala *Guss. inedit.*
In Calabriae arvis.
A F. germanica differt capitulis lana densa involutis.

184. Seriola cretica.
In Calabriae maritimis: circa *Stilo.*

185 Xeranthemum erectum: squamis calycinis exterioribus subrotundis mucronatis scariosis glabris, interioribus lanceolatis acutis erectis calycibus cylindraceis, caule superne ramoso. *Presel delic. prag. pag. 106.*
In pratis montanis.
Obs. A X. inaperto, squamis calycinis mucronatis differt.

186. X. cylindraceum. *Sibth. et Smith. Flor. Graec. Prodr. tom.* 2. *pag.* 172.
Ibidem.
187. Evax asterisciflora.
In collibus maritimis Calabriae; ad *Casam*, et *Rhegium*.
Obs. Nostra planta habet caulem basi ramosum, ut in Lamarckii icone repraesentatur. *Illustr. tab.* 694. Minus certe Morisonii planta (*hist.* 3. *sectio* 7. *t.* 11. *p.* 5) cum nostra et Lamarckiana convenit; nempe caule simplicissimo squamis calycinis sphacelatis praedita, ac non alpium incola dicitur. An diversa?
188. Gnaphalium microphyllum.
In Lucaniae montibus; ad *Potentiam*.
189. G. dioicum.
In Aprutii montibus alpinis; ad *Montem Cornu*.
190. Artemisia Mutellina *Lin*.
A spicata *Iacquin. Flor. Neap. Prodr. appendix quarta pag.* 32.
191. Echinops ritro.
In Aprutii montibus; ad *Montem di Accumuli*.
192. Artemisia variabilis: caule suffruticoso, foliis inferioribus bipinnatis pinnis tripartitis laciniis carnosulis semiteretibus, petiolis longissimis, junioribus, sericeo-incanis, laciniis brevissimis divaricato-recurvis, floribus racemoso-spicatis, calycibus ovato-oblongis angulatis: squamis laxiusculis acutis margine scariosis. *Nob*.
A. saligna *Flor. Neap. Prodr. supp.* 1 *p.* LXIII.
In sabulosis et rupibus maritimis Pausilypi, Puteolorum, Bajarum.
193. A. procera Var. foliis carnosulis rigidis, semiteretibus, racemis coarctatis, caule decumbente, floribus ovatis.
A. neapolitana *Ten. in litteris*. Floret septembri et octobri.

GYNANDRIA.

194. Ophrys Bertolonii: bulbis subrotundis, scapo folioso; labio convexo, elongato simplici, sursum incurvo, antice macula solitaria. *Moretti*, *Decad.* 6 *pag.* 9.
O. Scolopax *Ten. Flor. Neap. Prodr. pag.* LIII (non *Cavanil*).
In Apuliae arvis.

MONAECIA.

195. Carex macrolepis *DC*.
In Aprutii montibus; ad *Pizzo di Sivo*.
196. C. gynobasis.
In pratis *Acheruntinis*, et in *insula Caprearum*.
197. C. frigida; in *Monte Cornu*.

198. C. platystachya : spicula mascula solitaria, dilatata obovata vel elliptica, foemininibus subgeminis approximatis ellipticis sessilibus, stigmatibus tribus, fructibus triquetris ovatis brevissime rostratis pubescentibus, squamam ovatam obtusam, muticam, margine dilatato-scariosam subaequantibus, foliis rigidis, culmo brevioribus. *Nob.*

C. montana et collina. *Flor. Nap. Prodr.*

Cyperoides alpinum saxatile, caule cubitali, rotundo triquetro nudo, spicis brevibus binis vel ternis in summitate caulis confertim nascentibus, squamis obtuse mucronatis, capsulis oblongis turbinatis, crassioribus subhirsutis, in pellucidam et membranaceam cuspidem vix bifidam terminatis. *Micheli Gen. Plant. p. 63 tab. 32 fig. 4.*

In montibus Aprutii, Lucaniae et Calabriae, circa *Genosa*, *Cucuzzo*, *Sila*, *Morrone*.

Obs. A C. montana Will. differt culmo cubitali, sub spicis, glabro, foliis non angustissimis longiore; squamarum margine late argenteo-scariosis, spica mascula non lineari acuta, foemineis non subglobosis, capsulis utrinque acuminatis, non obovatis.

199. Platanus cuneata.

In paludosis Princip. citerior.; ad *Fiumara di Staffoli* prope *Sessa*.

200. Populus canescens.

In aquosis circa Neapolim.

201. Pinus Laricio *Var.* foliis brevioribus, rigidioribus, glaucescentibus, squamis strobilorum subangulatis.

In Aprutii et Calabriae montibus; ad *Pollinum*, *Silam Magellam*.

202. Quercus apennina.

In Calabriae nemoribus circa *Donnici*, *Le piane*, *Syphaeum*.

203. Q. austriaca.

Ibidem, et in Lucania, circa *Sila*, *Casalnuovo*, *Bosco di Noce*.

204. Q. brutia; foliis oblongis petiolatis, glabris, semipinnatifidis, laciniis approximatis, sinu acutissimo, obtusis emarginatis (1 poll. long 4-6 lin. lat.) altero latere subdentatis, fructibus ovato-ellipticis (diam. long. 13 lin., trans. 7 lin.) 2 - 3 subaggregatis, in petioli sesquipollicaris longitudinis summitate. *Ten. ad sem. 1825 enum. adnot. pag. 12.*

205. Q. Thomasii; foliis obovato-cuneiformibus petiolatis, laciniis semipinnatifidis remotis, sinu excavato, subintegerrimus, apice obtusiusculo integro, fructibus ovato-ellipticis (diam. long. 18 lin. transvers. 8 lin.) 2-3 subaggregatis in petioli sesquipollicaris longitudinis summitate. *Ten. loc. cit.*

Cum praecedenti in Calabriae et Principatus citerioris nemoribus (et circa *Neapolim* ad *Astroni*) habitat.

Q. pedunculatae species affines sunt; sed foliorum incisionibus, longitudine pedunculorum, aliisque notis supra expositis, distinctae.

206. Iuniperus phaenicea var. *B. Lobelii.*
Ad Hydrunti et Gallypolis litora.

POLYGAMIA.

207. Aegylops triaristata.
In arvis maritimis Calabriae.
208. Parietaria filiformis: cauliculis flexuosis procumbentibus; foliis ovatis utrinque attenuatis, pellucido-punctatis petiolos subaequantibus, glomerulis trifloris, duobus lateralibus hermaphroditis, intermedio masculo, involucro primario diphyllo, partiali tetraphyllo, calycibus quadrifidis. *Nob.*
In insulae Caprearum muris humidis umbrosis; ad *Salita di Capri.*
Floret majo et junio. Annua.
A P. judaica differt foliis utrinque acuminatis longe petiolatis, caulibus laxe procurrentibus (10 ad 15 poll.) fere capillaribus, caespitem non efformantibus.

CRYPTOGAMIA.

209. Asplenium viride.
In Aprutii montibus; ad *Pizzo di Sivo.*
210. A. angustifolium: stipite glaberrimo, frondibus oblongo-lanceolatis inferne bipinnatis superne pinnatis; pinnulis alternis divaricatis cuneiformibus 2 - 3 fidis, laciniis linearibus angustis, apice 2 - 3 dentato-incisis, soris subrotundis lacinia demum latioribus. *Guss. inedit.*
Ad Montem Cornu, et Magellam.
211. A. obovatum.
Ad rupes Cumae, insulae Inarimes, Rhegii julii et circa *Rogliano.*
212. Aspidium aculeatum.
A. dilatatum. *Flor. Neap. Prodr. et Flor. Med.*
In sylvis commune.
213. A. aculeatum. *Var. B.*
In nemoribus alpinis; ad *Montem Cornu.*
214. A. rigidum.
A. Oenopteris. *Flor. Neap. Prodr. pag.* LVIII.
In insulae Caprearum sepibus.

ADNOTATIONES IN ALIQUOT FLORÆ NEAPOLITANÆ PLANTIS, A CLAR. SPRENGELIO IN LINNÆI SYSTEMATIS VEGETABILIUM EDITIONE DECIMA SEXTA RECENSIS.

Tom. I. pag. 67. Salvia pyramidalis *Petag.* est S. Sclareae varietas.

Pag. 149. Ixia purpurascens. *Ten.*

Ab I. bulbocodium *Lin.* (*Triconema bulbocodium Spreng.*) differt stigmatibus antheris brevioribus; corollae petalis lanceolatis acutis purpureis, externe viridi striatis.

Ibid. Ixia minima. *Ten.* (Ixia Columnae *Schult.* Romulea Columnae *Sebast. et Mauri* R. Maratti *Sebast ex Sprengelio*).

Ab Ixia bulbocodio differt, scapo basi ramoso, corollis spathas subaequantibus flavescentibus vel pallide purpureis.

Pag. 335. Avena sicula *Spreng.* (Trisetum condensatum *Guss. ex Sprengelio loc. cit.* Avena condensata *Lin. enum. alter. l. pag. 82*) eadem planta est, quam in mei Prodromi appendice tertia, ad calcem tomi secundi Florae Neapolitanae, anno 1820 editi, publici juris feci.

Obs. Foliis vaginisque glaberrimis vel pubescentibus, locustis 2-3 florisque ludit.

Pag. 358 Bromus jubatus *Ten.* a B. madritensi differt, panicula effusa, pedunculis capillaribus longissimis, locustis cernuis aristisque triplo minoribus.

Pag. 543. Post Lithospermum fruticosum adde.

L. rosmarinifolium *Ten. Flor. Neap. Prodr. suppl. II. p. 65 Synops. p. 33 Flor. Neap. tom. III. tav. CXIV. non Pers.* L. graminifol. *B. Schultes Syst. veg. tom. IV. pag. 47*.

Pulcherrimus hic frutex, a L. fruticoso *Lin.* abunde differt foliis oblongo-linearibus, superficie superiori glabra lucida, rosmarini folia omnino aemulantibus non angustissimis, supra strigoso-hispidis.

A L. graminifolio *Viv.* (Pulmonaria suffruticosa *Lin.*) differt inprimis, caule fruticoso in lignosum arborescentem caespitem excrescente; foliis triplo brevioribus, latioribus, glabris.

Huc sane referendum clar. Bocconi synonymon: Lithospermum umbellatum latifolium *Plant. sic. pag. 75 tab. 74*. Ipse cl. auctor, cum plantam hanc ad montem *Peregrinum* prope *Panormum* nascentem, a L. angustif. umbell. *Gasp. Bauh* (P. suffruticosa *Lin.*) distinguere conatus fuisset, hujus iconem, eodem loco (*pag. 76 tab. 40 fol. 4 et tab. 41*) prope nostrae plantae iconem, depingi curavit.

Non nisi typographica menda, cl. Schultes, Lith. rosmarin. *Ten.* eodem tempore, duobus Lith. speciebus, proximis quidem at diversis, nempe *fruticoso* et *rosmarinifolio* potuit inscribere.

Pag. 572. Cl. Sibthorpius Cyclamen hederaefolium *Aitoni*, primum, Graeciae incolam dixit, atque in Florae Graecae Prodromo recensuit; deinde, graecae stirpis characteribus rectius inspectis, diversam fecit speciem, quam in Flora Graeca, Cycl. latifolii nomine fusius descripsit, magnificoque icone locupletavit C. hederaefolii, apud nos sponte nascentis, et C. latifolii, mei herbarii speciminibus probe collatis, cl. Sibthorpii sententiam, quam cl. Schultes sequutus est, libenter amplexus sum. C. hederaefol. enim habet folia angulata, simpliciter denticulata subtus violacea, petiolos glanduloso-verrucosos, corollaeque lacinias lanceolato-lineares. C. latifolium vero folia profert duplo majora, cordata nec angulata, duplicato vel triplicato crenata, infra pallida, petiolos leves, corollae lacinias oblongas. C. hederaefolium ad C. repandum Sibthorpii magis accedit, sed ab eo differre videtur, laciniis corollae lanceolato-linearibus, elongatis acutis, nec oblongis obtusis, petalisque glandulosis.

Pag. 619. Verbascum rotundifolium *Ten.* a V. phlomoidi distinguitur inprimis, foliis radicalibus orbiculatis, racemo simplici, aphyllo, fasciculis approximatis nudis.

Pag. 731. Campanula foliosa a C. glomerata facile disjungitur foliis utrinque laete viridibus flaccidis, grosse dentatis, florum capitulis *interrupte foliatis.*

Tom. II. pag. 43. Narcissus longiflorus habet corollae lacinias tubo duplo breviores, faciemque N. Ionquillae profert. Nar. praecox *Ten.* vero corollae laciniis tubum subaequantibus, floribusque N. Ionquillae triplo majoribus gaudet.

Pag. 38. Allium album *Savi* inter A. neapolitani *Cyr.* synonima adscribendum. Minime vero ejusdem loci est All. pendulinum *Ten.*, quod speciem distinctam, satis botanicis notam, constituit.

Pag. 40. Allium tenuiflorum ab A. moschato differt staminibus petala aequantibus, non tertio brevioribus, foliis semiteretibus sexquilinea latis setaceis filiformibus; floribus intense rubris inodoris.

Pag. 66. Muscari parviflorum *Des Font.* a M. botryoidi differt, foliis convoluto-filiformibus flaccidis, scapum aequantibus, vel scapo longioribus, non canaliculatis strictis, scapo dimidio brevioribus.

Pag. 542. Potentilla apennina *Ten.* quam *Spreng.* P. nitidae synonimon facit, est species omnino distincta. P. Bocconi nomine quoque a claris. *Nestler.* serius descripta. Ad eam quoque pertinet Heptaphillum trifoliatum argenteum montanum italicum, longius radicatum, crassioribus, et rotundioribus foliis. *Bocc. Mus.* 20 *tab.* 8. *f.* 4.

Pag. 647. Ranunculus Thomasii *Ten.* species est ab affinibus et a R. chaerophyllo praesertim satis distincta; habet enim folia

radicalia ternata, foliolis ripartito-trifidis; R. Thomasii R. millefoliato potius quam R. chaerophyllo affinis dici potest, a quo tamen characteribus datis satis differt.

Pag. 726. Lamium flexuosum *Ten.* cum Lamio maculato non confundendum. Nostra planta enim habet galeam integerrimam obtusam, Lamium album omnino referentem, nec emarginatam.

Pag. 784. Scrophularia grandidentata *Ten.* habet paniculae ramos aphyllos, foliaque glaberrima. S. scorodonia paniculae ramis foliatis, foliisque villosis gaudet; idcirco a priori diversa videtur.

Pag. 790. Linaria acutangula *Ten.* habet foliorum lobos mucronatos, foliaque floralia profunde 3-5 angulata, vel subpalmata, quod non in L. cymbalaria. Cultura non immutatur.

Pag. 734. Stachys pubescens *Ten.* maculis ferrugineis, corollae labio caret, calycibusque lanatis praedita est, idcirco a S. annua satis diversa videtur.

Pag. 744. Marrubium apulum *Ten.* a M. vulgare, satis differt, ob folia basi cuneiformia plicata undulata, eroso-crenata, longe petiolata.

Tom. III. pag. 73. Geranium nemorosum *Ten.* a G. pyrenaico inprimis differt petalis integerrimis, foliisque profunde sectis.

Pag. 74. Geranium villosum *Ten.* est planta annua, viridi-villosa cauleque ramoso elongato praedita, idcirco a G. cinereo omnino diversum.

Pag. 220. Genista amxantica *Ten.* a G. genuensi differt foliis late ovato-ellipticis obtusis subcoriaceis lucidis.

Pag. 259. Orobus variegatus *Ten.* ab O. verno differt radice tuberosa, foliis late ovatis, floribus confertis numerosissimis, vexillo venis purpureis picto.

Pag. 289. Medicago flexuosa *Ten.* a M. denticulata differt leguminibus undulato-flexuosis, stipulis ciliato-dentatis, foliolis retusis.

Pag. 290. Medicago agrestis *Ten.* a M. Gerardi differt leguminibus muricatis glabris.

Pag. 397. Centaurea deusta *Ten.* a C. splendenti differt, foliis rigidis coriaceis, laciniis lanceolato-falcatis, floribus rubris, anthodii squamis fusco-maculatis.

Pag. 405. Centaurea ceratophylla *Ten.* a C. rupestri differt caule depresso adscendente, floribus croceis.

Pag. 910. Conyra geminiflora *Ten.* a C. saxatili differt foliis lanceolatis undulatis, supra incano-virescentibus, anthodii squamis obtusis, adpressis omnibus.

Pag. 562. Senecio nebrodensis, habet caulem hirsutum uniflorum, folia repanda sinuata, radium multiflorum, calycemque non sphacelatum, quibus notis a S. foeniculaceo *Ten.* differt, qui folia plana, caulem glabriusculum, corymbiferum, calycem sphacelatum, radiumque parviflorum profert.

Pag. 798. Euphorbia fruticosa *Bivonae* cum E. paralias non confundenda est enim planta toto coelo diversa.

E. fruticosa a celebr. *Desfont.* inter E. spinosae varietates. (*Flor. Atl. t. 106*), recensita, at aequiori consilio a cl. *Bivona* tanquam distincta species descripta, tantum ab E. paralias recedit quantum et ipsa E. spinosa.

Pag. 799. E. caespitosa *Ten.* ab E. segetali differt inprimis caule suffruticoso.

Pag. 801. E neapolitana *Ten.* non est E. nicaensis varietas; obstant enim umbella - 3 - 5 radiata, dichotoma, non multifida, bifida, folia membranacea glauca, capsulaeque laeves. Nostra planta E. italicae *Lamarck*, faciem refert, a qua tamen datis caracteribus distinguitur.

Ibid. E. Baselicis *Ten.* ab E. myrsinite differt foliis sparsis laete virentibus, inferioribus obovatis, superioribus parabolicis, rotundatis, amplexicaulibus margine laevibus.
